

Số: 269/LĐLD

"V/v Tham gia phòng chống virút Zika"

Bến Tre, ngày 27 tháng 12 năm 2016

- Kính gửi: - Liên đoàn Lao động huyên, thành phố;
- Các Công đoàn ngành, CĐVC, CĐ các Khu công nghiệp;
- CĐCS trực thuộc LĐLD tỉnh, các Công đoàn Trung ương
đóng trên địa bàn.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh do virút Zika đã phát hiện ở Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã chỉ đạo “việc tham gia phòng chống virút Zika”. Bệnh do virút Zika gây ra là loại bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ người bệnh sang người lành do muỗi vằn đốt và có thể gây thành dịch. Hậu quả của những người bị nhiễm virút Zika có thể gây hội chứng não bé (đầu nhỏ) ở những đứa trẻ sinh ra từ mẹ bị mắc bệnh trong thời kỳ mang thai nhanh chóng phòng và hạn chế sự lây lan dịch bệnh góp phần bảo vệ sức khỏe cho CNVCLĐ, nhất là lao động sống ở các khu nhà trọ, môi trường ẩm thấp. Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung đẩy mạnh các hoạt động sau:

1. Phối hợp với ngành Y tế cùng cấp tổ chức tuyên truyền và phòng tránh virút Zika tại đơn vị, doanh nghiệp, địa phương với nhiều hình thức phù hợp như đọc trên loa, đài tại nơi công cộng, doanh nghiệp, bảng tin, tờ gấp...

- Phô tò nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của Bộ Y tế (*gửi kèm theo công văn này*) gửi tới CNLĐ để tuyên truyền về bệnh do virút Zika, cách phát hiện và phòng tránh.

- Công tác tuyên truyền cần tập trung ở những nơi đông CNLĐ, đặc biệt cho đối tượng phụ nữ đang mang thai và CNLĐ trong độ tuổi sinh đẻ.

2. Phát động công nhân lao động hưởng ứng thực hiện “*Nơi ở sạch đẹp - phòng chống virút Zika*” gồm các hoạt động:

- Dọn vệ sinh, rác thải tại nơi ở và xung quanh.

- Xóa bỏ các vũng lầy, vũng nước đọng, khơi thông cống rãnh, vệ sinh các bể nước sinh hoạt, diệt các ổ lăng quăng...

- Vận động CNVCLĐ thực hiện ngủ màn kể cả ban ngày.

3. Phối hợp với ngành Y tế vận động kinh phí từ đơn vị, doanh nghiệp để phát thuốc ngâm màn phòng chống muỗi cho mỗi hộ CNLĐ tại khu nhà trọ. Tổ chức xịt muỗi ở các khu tập thể, khu nhà trọ, nơi công cộng.

Đề nghị các cấp Công đoàn căn cứ tinh thần công văn này, tùy tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình để chủ động triển khai có hiệu quả./. *Nguyễn Văn*

Nơi nhận:

- Ban Nữ công TLĐ;
- Hội LHPN tỉnh;
- Như kg;
- Lưu VP, NC. *Th*

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Tân

5. LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÒNG BỆNH

DO VIRUT ZIKA?

Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh tốt nhất là **diệt muỗi và phòng tránh muỗi đốt**.

- Đậy kín các dụng cụ chứa nước; Thay nước, vệ sinh bên trong dụng cụ chứa nước ít nhất 1 tuần/lần.



- Lật úp hoặc loại bỏ các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến, các đồ vật phế thải gây đọng nước (chai lọ, ống bơ, vỏ dừa, lốp xe hỏng...).



- Thay nước lọ hoa/bình bông ít nhất 1 tuần/lần.




- Thay nước trong chậu hoa, cây cảnh bằng cát ẩm.

- Vệ sinh máng nước, ống dẫn, cống rãnh, mương nước... quanh nhà.


- Đốt hương muỗi, bình xịt, máy/vợt diệt muỗi...



- Ngủ màn kẽ cả ban ngày; dùng mành/rèm che cửa sổ/cửa ra vào



- Mặc quần áo dài tay; có thể sử dụng thuốc xua muỗi bôi vào vùng da hở




- Những người đến/về từ vùng có dịch cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày.
- Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị.

Cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh tại website của Bộ Y tế: <http://moh.gov.vn> hoặc Cục Y tế Dự phòng: <http://vncdc.gov.vn>.




Phòng chống bệnh DO VIRUT ZIKA



1. BỆNH DO VI RÚT ZIKA LÀ GÌ?

- Bệnh do vi rút ZIKA là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ người bệnh sang người lành do muỗi vằn đốt/chích và có thể gây thành dịch.




- Bệnh thường diễn biến lành tính, hiếm gặp những ca bệnh nặng và tử vong.
- Virut ZIKA có thể gây hội chứng não bé (đầu nhỏ) ở trẻ sinh ra từ những người mẹ mắc bệnh trong thời kỳ mang thai.
- Trẻ bị tật đầu nhỏ thường chậm phát triển trí tuệ, thể chất, và gây biến dạng khuôn mặt....



2. BỆNH CÓ BIỂU HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

- Khoảng 60% - 80% các trường hợp nhiễm vi rút zika không có biểu hiện.
- Bệnh thường bắt đầu đột ngột với các triệu chứng:
 - Sốt nhẹ từ 37,5°C đến 38°C;
 - Ban đỏ sần trên da;
 - Đau đầu, mỏi cơ khớp;
 - Viêm kết mạc mắt (đỏ mắt, chảy nước mắt);
 - Có thể có các biến chứng về thần kinh: viêm não màng não, hội chứng não bé ở trẻ sinh ra từ các bà mẹ nhiễm virut trong thời kỳ mang thai.



3. PHỤ NỮ CÓ THAI CẦN LÀM GÌ ĐỂ PHÒNG BỆNH DO VIRUT ZIKA?



- Không đến các quốc gia đang có dịch khi không cần thiết.
- Nếu phải đến các khu vực có dịch cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm vi rút zika theo hướng dẫn của cán bộ y tế.
- Sau khi về từ các khu vực có dịch cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn, xét nghiệm để phát hiện sớm yếu tố lây nhiễm.
- Chủ động áp dụng biện pháp chống muỗi đốt và tham gia các hoạt động diệt muỗi và bọ gậy (loăng quăng) tại cộng đồng.